

1.3.1	Potassium peroxomonosulfate
SPC, Labeling and Package Leaflet	RS

ECOCID® S

Prašak za dezinfekciju rastvorljiv u vodi

Dezinficijens

- Dezinfekcijsko sredstvo koje nije namijenjeno za direktnu primjenu na ljudima i životinjama
- Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni
- Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životnije
- Dezinfekcijska sredstva za pitku vodu

Sastav

100 g praška topivog u vodi sadrži 50 g pentakalijeva bis(peroksimonosulfata) bis(sulfata).

Pomoćne supstance (potencijalno opasne): natrijum-dodecilbenzen sulfonat, jabučna kiselina, sulfaminska kiselina, citral.

Uputstvo za upotrebu

Ecocid S je univerzalan i visoko djelotvoran dezinficijens namijenjen sigurnoj i učinkovitoj zaštiti od virusa. Uz to djeluje baktericidno i fungicidno.

Zbog visokog nivoa bezbjednosti i širokog spektra biocidnog djelovanja može se koristiti za različite namjene:

Veterinarske ustanove (veterinarske stanice, ambulante i laboratorije): Ecocid S se koristi za dezinfekciju svih površina kada je potrebno bezbjedno i efikasno uništavanje virusa, gram-pozitivnih i gram-negativnih bakterija te gljivica. Isto važi i za opremu, kontejnere, staklenu ambalažu, instrumente itd.

Objekti za smještaj životinja: Ecocid S se koristi za dezinfekciju svih površina i opreme u objektima za pripremu hrane, stajama, kućicama za pse, kavezima za zečeve, kavezima, košnicama i drugim prostorima za smještaj životinja.

Druga područja upotrebe: Ecocid S se koristi za dezinfekciju vozila, klanica, površina i objekata na stočnim sajmovima, objekata za pripremu i čuvanje hrane te za dezinfekciju opreme i površina u domaćinstvu.

Radni rastvor Ecocida S se koristi u obliku spreja, magle ili kupke za papke i kopita te dezinfekcione barijere. **Za dezinfekciju prethodno očišćene površine i opreme pripremite 1% rastvor Ecocida S.** Sadržaj kesice od 50 g rastvorite u 5 l vode. Da bi se prašak brže rastvorio, preporučuje se korišćenje mlake vode. Kada je potrebna veća količina dezinfekcionog rastvora, rastvorite sadržaj kese od 1 kg u 100 l vode.

Količina otopine dezinficijensa	Potrebna količina Ecocid S		
	Razrjeđenje		
	1:50	1:100	1:200
1 litra	20 g	10 g	5 g
10 litara	200 g	100 g	50 g
20 litara	400 g	200 g	100 g
50 litara	1 kg	500 g	250 g
100 litara	2 kg	1 kg	500 g
200 litara	4 kg	2 kg	1 kg

1.3.1	Potassium peroxomonosulfate
SPC, Labeling and Package Leaflet	RS

Primjena	Razblaživanje	Uputstvo za upotrebu
Završna dezinfekcija	1 : 100 (1%)	Radni rastvor nanesite na prethodno očišćenu površinu prskalicom niskog pritiska ili drugim oblikom mehaničkog raspršivača u dozi od 300 ml/m ² . Posle 30 do 60 minuta, ili pošto se površina osuši, vratite životinje.
Čišćenje i dezinfekcija opreme Na farmama, u inkubatorima, u objektima za pripremu krmiva	1 : 200 – 1 : 33 (0,5 do 3%) u zavisnosti od nivoa zaprljanosti	Očistite i dezinfikujte opremu nanošenjem radnog rastvora prskalicom niskog pritiska ili nekim drugim mehaničkim raspršivačem u dozi od 300 ml/m ² . Poslije 15 do 60 minuta, u zavisnosti od nivoa zaprljanosti, isperite čistom vodom.
Dezinfekcija sistema pijaće vode Završno čišćenje i dezinfekcija	1 : 200 (0,5%)	Radnim rastvorom napunite rezervoar za vodu i sistem za snadbijevanje. Poslije 60 minuta sistem temeljito isperite čistom vodom.
Kontinuirana sterilizacija pijaće vode	1 : 1000 (0,1%)	Dodajte odgovarajuću količinu Ecocida S u rezervoar za vodu ili pripremite odgovarajuću količinu radnog rastvora i sipajte je u uređaj za automatsko doziranje.
Dezinfekcione barijere za vozila i obuću, kao i kupke za dezinfekciju kopita i papaka	1 : 100 (1%)	Dezinfekcione barijere i kupku za kopita koristite 4 dana ili dok se ne zaprljaju previše.
Dezinfekcija vazduha Raspršivanje po vazduhu za smanjenje prenošenja zaraze tokom epidemije bolesti (osobito bolesti dišnog sistema)	1 : 200* (0.5%)	Dezinficirajte tlačnom napravom koja omogućuje vrlo fino raspršenje ili lednom prskalicom uz dozu od 1 l/10 m ² podne površine.
Hladno zamagljivanje	1 : 100 (1%)	Zamaglite prazne objekte (staje) pomoću mehaničkog uređaja za hladno zamagljivanje uz dozu od 1 l/10 m ² podne površine i ostavite da deluje 30 minuta. Objekte provjetravajte 30 do 60 minuta pre nego što vratite životinje.
Toplo zamagljivanje	1 : 25 (4%)	Prvo pomiješajte pojačivač zamagljivanja s vodom u razmjeri 15 dikeleova pojačivača na 85 dijelova vode. Rastvoru dodajte Ecocid S. Zamaglite objekte (štale) pomoću uređaja za toplo zamagljivanje uz dozu od 1 l/40 m ² podne površine i ostavite da deluje 30 do 60 minuta.

1.3.1	Potassium peroxomonosulfate
SPC, Labeling and Package Leaflet	RS

		Objekat provjetravajte 30 do 60 minuta prije nego što vratite životinje.
--	--	--

Neželjena dejstva i prva pomoć

Ako udisanje dovede do iritacije respiratornog sistema, žrtvu iznesite na svjež vazduh. Ako se pojave kašalj, teškoće s disanjem i astmatično disanje, odnosno ako oporavak nije brz, potražite medicinsku pomoć.

Dodir s kožom može da dovede do njene iritacije. Uklonite kontaminiranu odjeću sa zahvaćenog područja i isperite kožu sa mnogo vode. Ako i poslije ispiranja iritacija ne prolazi, potražite medicinsku pomoć.

Dodir s očima može dovesti do njihovog oštećenja. Temeljito ispirajte oči sa mnogo vode ili fiziološkog rastvora za ispiranje očiju najmanje 15 minuta, a zatim potražite medicinsku pomoć.

Ako se slučajno proguta, može izazvati gastrointestinalna oštećenja. Nemojte izazivati povraćanje. Usta isperite velikom količinom vode. Ako je pri svesti, žrtva mora da pije mnogo vode. Odmah potražite medicinsku pomoć.

Postupak s ostatkom proizvoda i njegovim pakovanjem

S ostatkom proizvoda i njegovim pakovanjem postupajte u skladu sa važećim regulatornim propisima.

Mjere opreza i druga uputstva

Tokom rada s ovim proizvodom nosite zaštitnu odeću i obuću, gumene rukavice i zaštitne naočare ili štitnik za lice.

Čuvajte u dobro zatvorenom originalnom pakovanju, zaštićeno od vlage i na temperaturi do 30°C. Čuvajte daleko do zapaljivih materijala i van domašaja dece.

Preporučuje se da se poslije otvaranja iskoristi čitav sadržaj kese Ecocida S.

Poslije upotrebe čistom vodom isperite pribor korišćen tokom dezinfekcije (raspršivači, prskalice, uređaje za zamagljivanje).

Za opštu upotrebu, profesionalne i industrijske korisnike.

Proizvođač

KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slovenija

Telefon: +386 7 33 12 072

Fax: + 386 7 33 22 631

