

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

▲ Tramadol Krka 50 mg/ml otopina za injekciju

▲ Tramadol Krka 100 mg/2 ml otopina za injekciju
tramadol

Prije uzimanja lijeka pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku.

Čuvajte ovo uputstvo o lijeku jer Vam može ponovno zatrebati.

Ako imate dodatnih pitanja, upitajte svog ljekara, farmaceuta ili medicinsku sestru.

Ovaj lijek je propisan Vama lično i ne smijete ga davati drugima jer im može štetiti čak i ako imaju simptome jednake Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceuta. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovom uputstvu.

Uputstvo o lijeku sadrži sljedeće podatke:

1. Šta je Tramadol Krka i za šta se koristi?
2. Prije nego počnete uzimati Tramadol Krka
3. Kako uzimati Tramadol Krka?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Tramadol Krka?
6. Dodatne informacije

1. Šta je Tramadol Krka i za šta se koristi?

Tramadol - aktivna supstanca u Tramadolu Krka - je analgetik, a spada u skupinu opioida koji djeluju na centralni nervni sistem. Ublažava bol djelovanjem na posebne nervne stanice u leđnoj moždini i mozgu.

Tramadol Krka se primjenjuje za liječenje umjerene do jake boli.

2. Prije nego počnete uzimati Tramadol Krka

Nemojte uzimati Tramadol Krka

- ako ste alergični na tramadol ili bilo koju pomoćnu supstancu ovog lijeka (navedeno u dijelu 6);
- kod akutnog trovanja alkoholom, tabletama za spavanje, analgetika ili drugih psihotropnih lijekova (lijekovi koji djeluju na raspoloženje i osjećaje);
- ako uzimate MAO inhibitore (neki lijekovi za liječenje depresije) ili ste ih uzimati tokom prethodne dvije sedmice (vidjeti "Uzimanje drugih lijekova sa Tramadol Krka");
- ako imate epilepsiju koja se liječenjem ne može odgovarajuće kontrolisati;
- kao zamjena kod ustezanja droga.

Budite oprezni sa Tramadol Krka

Posavjetujte se sa svojim ljekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom prije primjene Tramadola Krka:

- ako smatrate da ste ovisni o drugim analgeticima (opioidima);
- ako imate poremećaje svijesti (osjećate nesvjesticu);
- ako ste u šoku (hladan znoj može biti znak);
- ako imate povišen pritisak u lubanji (moguć je nakon ozljede glave ili bolesti mozga);
- ako otežano dišete;
- ako ste skloni epilepsiji ili napadima;
- ako imate teškoće s jetrom ili bubrezima.
- ako bolujete od depresije i uzimate antidepresive jer neki od njih mogu stupiti u interakciju s tramadolum (vidjeti "Drugi lijekovi i tramadol").
-
- Serotoninski sindrom
- Postoji mali rizik da ćete doživjeti takozvani serotoninski sindrom koji se može pojaviti nakon uzimanja tramadola u kombinaciji s određenim antidepresivima ili samog tramadola. Odmah potražite liječnički savjet ako imate bilo koji od simptoma povezanih s ovim ozbiljnim sindromom (vidjeti odjeljak 4 "Moguće nuspojave").
-

Odobreno
ALMBIH
12.12.2024.

- Poremećaji disanja povezani sa spavanjem

Tramadol Krka može uzrokovati poremećaje disanja povezane s spavanjem kao što su apneja za vrijeme spavanja (prekidi disanja tokom spavanja) i hipoksemija povezana sa snom (niska razina kisika u krvi). Simptomi mogu uključivati pauze u disanju tokom spavanja, noćno buđenje zbog nedostatka zraka, poteškoće s održavanjem sna ili pretjeranu pospanost tokom dana. Ako vi ili neka druga osoba primijetite ove simptome, obratite se svom ljekaru. Vaš ljekar može razmotriti smanjenje doze. Epileptički napadi su opisani kod bolesnika koji uzimaju tramadol u preporučenoj dozi. Rizik može biti povećan ako se premaši preporučena najveća dnevna doza od 400 mg tramadola.

Imajte u vidu da ovaj lijek može dovesti do psihološke i fizičke ovisnosti. Produženim uzimanjem učinak ovog lijeka se može smanjiti te se mora uzeti veća doza (razvoj tolerancije). Kod bolesnika koji su skloni zloupotrebi lijeka ili ovisnosti o lijeku, liječenje Tramadolom Krka treba trajati samo kraće razdoblje i pod strogim ljekarskim nadzorom.

Ekstremni umor, nedostatak apetita, jaka bol u trbuhu, mučnina, povraćanje ili nizak krvni tlak. To može značiti da imate insuficijenciju nadbubrežne žlijezde (niske razine kortizola). Ako imate ove simptome, obratite se svom ljekaru koji će odlučiti trebate li uzimati hormonski dodatak. Tramadol se transformira u jetri pomoću određenog enzima. Neke osobe imaju varijaciju tog enzima, što na njih može djelovati na različite načine. Kod nekih osoba ublažavanje boli možda neće biti dostatno, a kod drugih je veća vjerojatnost razvoja ozbiljnih nuspojava. Opazite li bilo koju od sljedećih nuspojava, ovaj lijek morate prestati uzimati i odmah zatražiti ljekarski savjet: sporo ili plitko disanje, smetenost, pospanost, sužene zjenice, mučnina ili povraćanje, zatvor, gubitak apetita.

Također Vas molimo da obavijestite svog ljekara, farmaceuta ili medicinsku sestru ako se pojavi neka od tih teškoća dok primete Tramadol Krka ili ako se taj podatak nekad odnosio na Vas.

Uzimanje drugih lijekova sa Tramadol Krka

Recite svom ljekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri ako uzimate/koristite, nedavno ste uzeli/koristili ili biste mogli uzimati/koristiti bilo koji drugi lijek.

Tramadol Krka se ne smije primjenjivati zajedno s MAO inhibitorima (neki lijekovi za liječenje depresije) (vidjeti "Nemojte uzimati Tramadol Krka").

Učinak Tramadola Krka na ublažavanje boli može oslabiti i/ili se skratiti ako uzimate i lijekove koji sadržavaju neku od sljedećih aktivnih supstanci:

- karbamazepin (primjenjuje se za liječenje epilepsije)
- ondansetron (primjenjuje se za sprječavanje mučnine)

Ljekar će Vam reći smijete li primiti ovaj lijek i koju dozu trebate primiti.

Istovremena primjena Tramadola Krka i lijekova za smirenje kao što su benzodiazepini ili slični lijekovi povećava rizik od omamljenosti, poteškoća u disanju (respiratorne depresije), kome te može biti opasna po život. Zbog toga istodobnu primjenu treba razmotriti jedino kada drugi načini liječenja nisu mogući.

Međutim, ako Vaš ljekar odluči propisati Tramadol Krka istovremeno s lijekovima za smirenje, također je potrebno da ograniči dozu i trajanje istodobnog liječenja.

Obavijestite svojeg ljekara o svim lijekovima za smirenje koje uzimate i pažljivo pratite njegove preporuke vezane uz doziranje. Moglo bi biti od pomoći da obavijestite prijatelje ili rodbinu o gore navedenim znacima i simptomima. Javite se svojem ljekaru ako osjetite takve simptome.

Rizik od nuspojava se povećava:

- ako uzimate Tramadol Krka u isto vrijeme kad i lijekove koji također djeluju depresorno na funkciju mozga. Tada možete osjećati omaglicu ili nesvjesticu. Ako se to dogodi, molimo Vas da obavijestite svog ljekara. Ti drugi lijekovi uključuju sedative, tablete za spavanje i neke jake analgetike kao što su morfin i kodein (isto kao i lijekovi za suzbijanje kašlja) i alkohol.

Odobreno
ALMBIH
12.12.2024.

- ako uzimate lijekove koji mogu prouzročiti konvulzije (epileptičke napade), kao što su neki antidepresivi ili antipsihotici. Rizik za pojavu napada može se povećati ako uzmete ovaj lijek u isto vrijeme. Ljekar će Vam reći je li Tramadol Krka prikladan za Vas.
- ako uzimate određene antidepresive. Tramadol Krka otopina za injekciju/infuziju može stupiti u interakciju s ovim lijekovima i možete doživjeti serotonininski sindrom (vidjeti dio 4. "Moguće nuspojave"). ako uzimate kumarinske antikoagulanse (lijekovi koji sprječavaju normalno zgrušavanje krvi), npr. varfarin zajedno s ovim lijekom. Antikoagulantni učinak tih lijekova može biti smanjen te može doći do krvarenja.

Uzimanje hrane i pića sa Tramadol Krka

Tokom liječenja Tramadolom Krka ne smijete piti alkoholna pića jer se učinak lijeka može pojačati. Hrana ne utiče na učinak Tramadola Krka.

Djeca i adolescenti

Primjena kod djece s teškoćama u disanju

Tramadol se ne preporučuje kod djece s teškoćama u disanju, jer se simptomi toksičnosti tramadola kod te djece mogu pogoršati.

Trudnoća i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, posavjetujte se s ljekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom prije primanja ovog lijeka.

Budući da je dostupno tek nešto malo podataka koji se odnose na sigurnost tramadola tokom trudnoće, Tramadol Krka ne smijete primjenjivati ako ste trudni.

Ponavljana primjena Tramadola Krka tokom trudnoće može dovesti do navikavanja nerođenog djeteta na tramadol te posljedično do simptoma ustezanja nakon rođenja novorođenčeta.

Iskustvo iz primjene kod ljudi pokazuje da tramadol nema učinka na plodnost kod muškaraca i žena.

Dojenje

U majčino mlijeko se izlučuje tramadol. Zbog toga ne biste smijeli koristiti Tramadol Krka više od jedanput tokom dojenja. Ako ste uzeli Tramadol Krka više od jedanput, morate prestati dojiti.

Upravljanje vozilima i mašinama

▲ Lijek sa snažnim uticajem na psihofizičke sposobnosti (zabrana upravljanja motornim vozilima i mašinama).

Tramadol Krka može uzrokovati omaglicu, omamljenost i poremećaje vida (zamagljen vid) te na taj način smanjiti sposobnost reagiranja. Ako osjećate da je Vaša sposobnost reagiranja smanjena, nemojte voziti osobni automobil ili druga vozila niti rukovati električnim alatom ili mašinama. Također, nemojte raditi ako niste stabilni.

Posebne informacije o nekim sastojcima lijeka

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po dozi, što u biti znači "bez natrija".

3. Kako uzimati Tramadol Krka?

Tramadol Krka uvijek primjenjujte onako kako Vam je rekao Ljekar. Ako niste sigurni, provjerite kod svojeg ljekara, farmaceuta ili kod medicinske sestre.

Doziranje treba biti prilagođeno jačini boli i Vašoj individualnoj osjetljivosti. Općenito treba izabrati najnižu dozu koja uklanja bol. Dnevnu dozu od 8 ml Tramadola Krka (ekvivalentno 400 mg tramadol hidroklorida) se ne smije premašiti, osim ako nije izričito propisano od strane ljekara

Osim ako je drugačije propisano od strane ljekara, uobičajena doza je:

Odrasli i adolescenti u dobi iznad 12 godina

**Odobreno
ALMBIH
12.12.2024.**

Ovisno o boli, primjenjuje se 1 do 2 ml Tramadola Krka (ekvivalentno 50 - 100 mg tramadol hidroklorida).

Ovisno o boli, učinak traje 4 do 6 sati.

Za ljekare i medicinsko osoblje dodatne informacije o primjeni Tramadola Krka mogu se naći na kraju ovog uputstva.

Djeca

Tramadol Krka nije namijenjen za primjenu kod djece mlađe od 1 godine.

Kao pojedinačna doza, djeca od 1 do 11 godina dobivaju 0,2 do 0,4 ml (ekvivalentno 10 do 20 mg tramadol hidroklorida) na 10 kilograma tjelesne težine. Ne smiju se prekoračiti maksimalne dnevne doze od 1,6 ml Tramadola Krka (ekvivalentno 80 mg tramadol hidroklorida) na 10 kilograma tjelesne težine ili 8 ml Tramadola Krka (ekvivalentno 400 mg tramadol hidroklorida) (treba dati manju od dvije doze), osim ako to ljekar nije izričito propisao.

Ljekari i medicinsko osoblje mogu dodatne informacije o primjeni Tramadola Krka djeci naći na kraju ovog uputstva.

Stariji bolesnici

Kod starijih bolesnika (iznad 75 godina) izlučivanje tramadola može biti usporeno. Ako se to odnosi na Vas, ljekar Vam može preporučiti produženje vremenskog intervala između doziranja.

Ozbiljne bolesti jetre ili bubrega (insuficijencija)/bolesnici na dijalizi

Ako je u Vašem slučaju insuficijencija blaga ili umjerena, ljekar može preporučiti produženje intervala doziranja.

Kako i kada trebate primijeniti Tramadol Krka?

Tramadol Krka se injicira intravenozno, intramuskularno ili supkutano (intravenozni Tramadol Krkase obično injicira u potkožnu krvnu žilu ruke, intramuskularno većinom u glutealni mišić i supkutano ispod kože).

Kao druga mogućnost, Tramadol Krka se može razrijediti i dati u venu pomoću infuzije. Za ljekare i medicinsko osoblje se dodatne informacije o davanju Tramadola Krka mogu naći na kraju ove upute.

Kako dugo trebate uzimati ovaj Tramadol Krka?

Nemojte primjenjivati Tramadol Krka duže nego što je to zaista potrebno. Ako se produženo liječenje smatra potrebnim, ljekar će provjeriti u pravilnim, kratkim intervalima (ako je potrebno uz prekid liječenja) trebate li nastaviti primati Tramadol Krka, je li prikladan i u kojoj dozi.

Obavijestite svojeg ljekara, farmaceuta ili medicinsku sestru ako Vam se čini da je učinak Tramadola Krka prejak ili preslab.

Ako ste primili više Tramadol Krka nego što biste trebali

Ako ste greškom primili dodatnu dozu Tramadola Krka, najčešće neće biti negativnih učinaka. Sljedeću dozu Tramadol Krka uzmite kako je propisano.

Ako ste primili značajno veću dozu od preporučene, mogu se pojaviti sljedeći znakovi: sužene zjenice, povraćanje, pad krvnog tlaka, ubrzani srčani ritam, cirkulatorni kolaps, poremećaji svijesti sve do kome (duboka nesvijest), epileptički napadi i otežano disanje sve do respiratornog aresta. Ako se pojave ovi znakovi, odmah to javite svojem ljekaru.

Ako ste zaboravili uzeti Tramadol Krka

Ako zaboravite uzeti Tramadol Krka, bol Vam se može vratiti. Ne uzimajte dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu, već nastavite kao prije.

**Odobreno
ALMBIH
12.12.2024.**

Ako prestanete uzimati Tramadol Krka

Ako ste prekinuli ili prerano završili liječenje Tramadolom Krka, bol će Vam se vjerovatno vratiti. Ako želite prekinuti liječenje jer imate neugodne nuspojave, obratite se svom ljekaru.

Općenito, prekid liječenja Tramadolom Krka ne uzrokuje bilo kakve nuspojave. Ipak se nepoželjni učinci mogu pojaviti kod nekih bolesnika koji su ovaj lijek uzimali kroz duže vrijeme i naglo prekinuli uzimanje lijeka. Oni mogu osjećati nemir, tjeskobu, nervozu ili drhtanje. Također mogu biti hiperaktivni, mogu imati teškoća sa spavanjem ili probavne smetnje. Vrlo malo osoba je doživjelo napadaje panike, halucinacije, lažne osjete kao što su trnci, peckanje i neosjetljivost ili zujanje u ušima (tinitus). Veoma rijetko su prijavljeni neuobičajeni simptomi centralnog nervnog sistema kao što su smušenost, deluzije, promijenjen doživljaj vlastite osobe (depersonalizacija) i stvarnosti (derealizacija) te paranoja. Ako dođe do bilo koje navedene nuspojave nakon prekida liječenja ovim lijekom, javite se svom ljekaru.

Ako prestanete uzimati Tramadol Krka

Ne smijete naglo prestati uzimati ovaj lijek, osim ako Vam ljekar tako ne kaže. Ako želite prestati uzimati lijek, najprije o tome porazgovarajte sa svojim ljekarom, osobito ako ste lijek uzimali duže vrijeme. Vaš liječnik će Vam savjetovati kada i kako prestati uzimati lijek, što može podrazumijevati postupno smanjivanje doze kako bi se smanjila vjerojatnost razvoja nepotrebnih nuspojava (simptoma ustezanja).

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primjeni ovog lijeka, porazgovarajte s ljekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom.

4. Moguće nuspojave

Kao svi lijekovi i ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, koje se ne javljaju kod svih bolesnika.

Odmah se javite svom ljekaru ako se pojave simptomi alergijske reakcije, kao što je oticanje lica, jezika i/ili grla i/ili otežano gutanje ili urtikarija s otežanim disanjem.

Najčešće nuspojave koje se javljaju tokom liječenja Tramadolom Krka su mučnina i omaglica, koje se javljaju kod više od 1 na 10 osoba koje uzimaju lijek.

Veoma česte (pogađaju više od 1 osobe koja uzima lijek na 10):

-mučnina, omaglica.

Česte (pogađaju više od 1 osobe koje uzimaju lijek na 10):

-glavobolja, pospanost, umor, povraćanje, zatvor, suha usta; znojenje (hiperhidroza).

Manje česte (pogađaju više od 1 osobe koje uzimaju lijek na 100):

-učinci na kardiovaskularnu regulaciju (palpitacije, povećan srčani ritam [tahikardija], omaglica [posturalna hipotenzija] ili cirkulatorni kolaps). Ove nuspojave se osobito mogu javiti kod ustajanja i kod bolesnika koji su pod fizičkim stresom.

-nagon za povraćanjem, želučani poremećaji (npr. pritisak u želucu, nadutost), proljev.

-kožne reakcije (npr. svrbež, osip).

Rijetke (pogađaju 1 do 10 osoba koje uzimaju lijek na 10 000):

-alergijske reakcije (npr. otežano disanje [dispneja], hripanje, zadržavanje vode u tkivima [angioedem]) i šok reakcije (naglo zatajenje cirkulacije) javljaju se vrlo rijetko.

-usporeni srčani ritam (bradikardija).

-povišenje krvnog pritiska

-lažni osjeti na koži (kao što su trnci, bockanje, utrnulost), drhtanje (tremor), epileptiformni napadaji, nehotično trzanje mišića, nenormalna koordinacija, prolazni gubitak svijesti (sinkopa), poremećaji govora.

-epileptiformni napadaji pojavljuju se uglavnom nakon primjene visokih doza tramadola ili nakon istovremene primjene lijekova koji mogu izazvati napadaje.

-promjene apetita.

-halucinacije, smušenost, poremećaji spavanja, delirij, tjeskoba i noćne more.

**Odobreno
ALMBIH
12.12.2024.**

-Mentalni poremećaji mogu se javiti nakon liječenja Tramadolom Krka; njihov intenzitet i priroda mogu varirati kod pojedinih bolesnika (ovisno o bolesnikovoj osobnosti i trajanju liječenja).

-Tu su uključene promjene u raspoloženju (obično ushićeno raspoloženje, ponekad razdraženo raspoloženje), promjene u aktivnosti (obično potisnuta, ponekad povećana) i smanjenje osjetilne percepcije i spoznavanja, koje može dovesti do grešaka u donošenju odluka (smanjenje osjetilne i spoznajne sposobnosti).

-Može se pojaviti ovisnost.

- Nakon prekida liječenja, mogu se pojaviti reakcije ustezanja (vidjeti "Ako prestanete primati Tramadol Krka").

-Zamućeni vid, sužene zjenice (mioza), prekomjerno proširene zjenice (midrijaza).

-Usporeno disanje (respiratorna depresija), otežano disanje (dispneja).

-Ako su preporučene doze premašene ili se istovremeno primijene drugi lijekovi s depresornim učinkom na funkciju mozga, može doći do usporavanja disanja.

-Iako je prijavljeno pogoršanje astme, uzročna povezanost s djelatnom tvari tramadolom nije se mogla utvrditi.

-Smanjena napetost mišića (motorička slabost).

-Otežano ili bolno mokrenje, manje mokraće nego što je normalno (poremećaji mikcije i dizurija).

Vrlo rijetke (pogađaju manje od 1 osobe koja uzima lijek na 10 000):

-Povišeni jetreni enzimi.

Nepoznato (učestalost se ne može odrediti iz dostupnih podataka):

-Niske razine šećera u krvi.

-Štucanje

Serotoninski sindrom, koji se može manifestirati kao promjene mentalnog statusa (npr. agitacija, halucinacije, koma) i drugi učinci, kao što su vrućica, ubrzani otkucaji srca, nestabilan krvni tlak, nehotično trzanje, mišićna rigidnost, nedostatak koordinacije i/ili gastrointestinalni simptomi (npr. mučnina, povraćanje, proljev) (vidjeti dio 2 "Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Tramadol Krka"). Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu.

5. Kako čuvati Tramadol Krka?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25°C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove baciti u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Dodatne informacije

Šta Tramadol Krka sadrži?

- Aktivna supstanca je tramadol hidrohlorid.

1 ampula od 1 ml Tramadol Krka 50 mg otopine za injekciju sadrži 50 mg tramadol hidrohlorida.

1 ampula od 2 ml Tramadol Krka 100 mg otopine za injekciju sadrži 100 mg tramadol hidrohlorida.

- Drugi sastojci su: natrijev acetat, bezvodni i voda za injekcije.

Kako Tramadol Krka izgleda i sadržaj pakovanja?

Otopina za injekciju je bistra, bezbojna otopina, bez vidljivih stranih čestica.

Tramadol Krka otopina za injekciju 50 mg/ml: 5 staklenih ampula od 1 ml, u kutiji, svaka ampula obilježena plavim prstenom.

Tramadol Krka otopina za injekciju 100 mg/2 ml: 5 staklenih ampula od 2 ml, u kutiji, svaka ampula obilježena zelenim prstenom.

Režim izdavanja

**Odobreno
ALMBIH
12.12.2024.**

Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa.

PROIZVOĐAČ

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Republika Slovenija

PROIZVOĐAČ GOTOVOG LIJEKA

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Republika Slovenija

NOSILAC DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA FARMA d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 125A, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

DATUM I BROJ DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Tramadol Krka 50 mg/ml broj: 04-07.3-2-5043/20 od 07.06.2021.

Tramadol Krka 100 mg/2 ml broj: 04-07.3-2-5042/20 od 07.06.2021.

DATUM POSLJEDNJE REVIZIJE TEKSTA : 12.12.2024.

Sljedeće informacije su namijenjene samo ljekarima i medicinskom osoblju:

▲ Tramadol Krka 50 mg/ml otopina za injekciju
▲ Tramadol Krka 100 mg/2 ml otopina za injekciju
tramadol

Opaska o otvaranju ampule lomljenjem



Ampula ima točku lomljenja te se lako može otvoriti bez pomagala.

1. Rotirajte ampulu da točka bude okrenuta prema gore.
2. Slomite vrh ampule.

Dodatne informacije o primjeni

Za umjerenu bol se primjenjuje 1 ml Tramadola Krka (ekvivalentno 50 mg tramadol hidrohlorida). Ako se bol ne ublaži nakon 30 do 60 minuta, ponovno se može dati 1 ml.

Kod jakih boli kad će vjerojatno biti potrebna veća doza, 2 ml Tramadola Krka (ekvivalentno 100 mg tramadol hidrohlorida) daje se kao pojedinačna doza.

Za liječenje jake postoperativne boli mogu biti potrebne još veće doze za analgeziju na zahtjev (liječenje boli prema potrebi) u ranom postoperativnom periodu. Potrebe tokom 24 sata općenito nisu veće kod normalne primjene.

Tramadol Krka se injicira intravenozno, intramuskularno ili supkutano (intravenozno se Tramadol Krka obično injicira u potkožnu krvnu žilu, intramuskularno u glutealni mišić i supkutano ispod kože).

Intravenozna primjena je spora, tj. 1 ml Tramadola Krka (ekvivalentno 50 mg tramadol hidrohlorida) na minutu.

Alternativno se Tramadol Krka može razrijediti s odgovarajućom infuzijskom otopinom (npr. 0,9%-tni natrijev klorid ili 5%-tna otopina glukoze) i primijeniti za intravenoznu infuziju ili za analgeziju koju nadzire sam bolesnik (PCA).

Inkompatibilnosti Tramadola Krka

**Odobreno
ALMBIH
12.12.2024.**

Tramadol Krka je inkompatibilan (ne može se miješati) u otopinama za injekciju s:

- diklofenakom
- indometacinom
- fenilbutazonom
- diazepamom
- flunitrazepamom
- midazolamom
- gliceril trinitratom

Kako primjenjivati Tramadol Krka za liječenje djece u dobi iznad 1 godine (vidjeti "Kako uzimati Tramadol Krka")

Izračun volumena injekcije

- 1) Izračun potrebne ukupne doze tramadol hidrohlorida u mg: tjelesna težina (kg) x doza (mg/kg).
- 2) Izračun volumena razrijeđene otopine za injekciju tramadol hidrohlorida koja će biti injicirana: podijeli ukupnu dozu (mg) pomoću razrijeđene otopine za injekciju odgovarajuće koncentracije (mg/ml, vidjeti tablicu niže).

Iz tog razloga je Tramadol Krka razrijeđen vodom za injekcije. Pregled niže prikazuje tako dobivene koncentracije (1 ml otopine za injekciju Tramadol Krka sadržava 50 mg tramadol hidrohlorida):

Razrjeđivanje Tramadol Krka 50 mg otopine za injekciju i Tramadol Krka 100 mg otopine za injekciju:

s vodom za injekcije		dobivaju se sljedeće koncentracije
Tramadol Krka 50 mg otopina za injekciju	Tramadol Krka 100 mg otopina za injekciju	
1 ml + 1 ml	2 ml + 2 ml	25,0 mg/ml
1 ml + 2 ml	2 ml + 4 ml	16,7 mg/ml
1 ml + 3 ml	2 ml + 6 ml	12,5 mg/ml
1 ml + 4 ml	2 ml + 8 ml	10,0 mg/ml
1 ml + 5 ml	2 ml + 10 ml	8,3 mg/ml
1 ml + 6 ml	2 ml + 12 ml	7,1 mg/ml
1 ml + 7 ml	2 ml + 14 ml	6,3 mg/ml
1 ml + 8 ml	2 ml + 16 ml	5,6 mg/ml
1 ml + 9 ml	2 ml + 18 ml	5,0 mg/ml

Primjer: Želimo dati dozu od 1,5 mg tramadol hidrohlorida na kilogram tjelesne težine djetetu od 45 kg. Za to je potrebno 67,5 mg tramadol hidrohlorida. Razrijedite 2 ml Tramadol Krka 50 mg otopine za injekciju (ekvivalentno dvjema ampulama od 1 ml) ili 2 ml Tramadol Krka 100 mg otopine za injekciju (ekvivalentno jednoj ampuli od 2 ml) s 4 ml vode za injekcije. Tako će koncentracija biti 16,7 mg tramadol hidrohlorida na mililitar. Od razrijeđene otopine daje se 4 ml (oko 67 mg tramadol hidrohlorida).