

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1.3.1                             | Thiethylperazine          |
| SPC, Labeling and Package Leaflet | BA-Bosnia and Herzegovina |

## SAŽETAK KARAKTERISTIKA LIJEKA

### 1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

▲ Torecan 6,5 mg/ml otopina za injekciju

### 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV LIJEKA

1 ml otopine za injekciju (1 ampula) sadrži 6,5 mg tietilperazina u obliku 10,86 mg tietilperazin dimalata.

Pomoćne supstance:

- sorbitol (E420): 40 mg/ml
- natrij metabisulfit (E223): 0,5 mg/ml

Za cjelokupan popis pomoćnih supstanci pogledajte poglavlje 6.1.

### 3. FARMACEUTSKI OBLIK

Otopina za injekciju.

Otopina je bistra, bezbojna ili lagano žuta.

### 4. KLINIČKE POJEDINOSTI

#### 4.1. Terapijske indikacije

Liječenje mučnine i povraćanja:

- nakon hirurških zahvata,
- nakon citotoksične hemoterapije,
- kod terapija sa zračenjem,
- nakon uzimanja lijekova s emetičnim učinkom.

#### 4.2. Doziranje i način primjene

##### Doziranje

Preporučena dnevna doza tietilperazina je jedanput po 6,5 mg do triput po 6,5 mg.

##### Posebne populacije

##### *Oštećenje funkcije bubrega*

Nikakva ispitivanja nisu bila provedena u bolesnika s oštećenjem funkcije bubrega.

##### *Oštećenje funkcije jetre*

U bolesnika s oštećenom funkcijom jetre potrebno je tijekom uzimanja velikih doza i tijekom dugotrajnog uzimanja lijeka Torecana pratiti rad jetre (pogledajte poglavlja 4.4 i 4.8).

##### *Pedijatrijska populacija*

Doza za djecu nije određena, a lijek ne smijemo davati mlađim od 15 godina.

##### *Stariji*

Za starije bolesnike (75 godina i više) je, zbog opasnosti nehotičnih pokreta, preporučeno najviše dvomjesečno liječenje.

##### Način primjene

Lijek injiciramo intramuskularno, a intravenozno zbog opasnosti hipotenzije samo iznimno i polako. Posljednje dolazi u obzir osobito kod akutnih slučajeva, kod kojih injiciramo 1 ampulu.

Za sprječavanje povraćanja nakon operativnog zahvata dajemo 1 ampulu intramuskularno pola sata prije kraja operacije.

#### 4.3. Kontraindikacije

Preosjetljivost na aktivnu supstancu, fenotiazine ili bilo koju pomoćnu supstancu, navedenu u poglavlju 6.1.

Teška depresija centralnog nervnog sistema odnosno poremećaji svijesti.

|                 |                                  |             |
|-----------------|----------------------------------|-------------|
| PI_Text074959_1 | 14.06.2024 - Updated: 14.06.2024 | Page 1 of 6 |
|-----------------|----------------------------------|-------------|

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1.3.1                             | Thiethylperazine          |
| SPC, Labeling and Package Leaflet | BA-Bosnia and Herzegovina |

Klinički značajna hipotenzija.

Lijek Torecan ne smiju primati djeca mlađa od 15 godina (zbog opasnosti ekstrapiramidnih neželjenih djelovanja) te djeca i adolescenti sa simptomima ili znakovima koji bacaju sumnju na Reyov sindrom (zbog sličnosti sa neželjenim djelovanjima Torecana te posljedičnom mogućnosti previđanja dijagnoze).

Trudnoća (pogledajte poglavlje 4.6).

Dojenje (pogledajte poglavlje 4.6).

#### 4.4. Posebna upozorenja i mjere opreza pri upotrebi

Kao i ostali antiemetici, tietilperazin može prikriti simptome nekih bolesti probavnog trakta i centralnog nervnog sistema, te toksične učinke drugih lijekova.

Zbog aditivnog hipotenzivnog učinka tietilperazina, lijek oprezno dajemo bolesnicima sa spinalnom anestezijom ili onima koji istovremeno uzimaju beta-adrenergičke blokatore. Hipotenzivni učinak Torecana je također opasan za trudnice sa preeklampsijom jer im se krvni pritisak može izrazito sniziti. Torecan nikada ne smijeno injicirati intraarterijski. Preporučeno je da za vrijeme parenteralne aplikacije (također i.m.) bolesnici leže, a nakon nje bolesnike treba najmanje jedan sat brižno pratiti.

Kad Torecan dajemo bolesnicima sa anamnezom diskinezije, te bolesnicima sa umjereno do jako oslabljenom jetrenom funkcijom moramo biti oprezni.

Fenotijazini mogu uzrokovati maligni neuroleptički sindrom, koji se klinički očituje kao hiperpireksija, mišićna rigidnost, promijenjeni psihički status te znakovi nestabilnosti autonomnog nervnog sistema. U takvom slučaju liječenje treba odmah prekinuti.

Kod liječenja starijih bolesnika preporučujemo ograničenje trajanja liječenja (pogledajte 4.2. Doziranje i način primjene).

Također su izvještavali o ekstrapiramidalnim simptomima (npr. distonija, tortikolis, disfazija, okulogirna kriza, akatizija). Izvještavali su i o grčevima mišića. Određeni simptomi su više mogući u djece i adolescenata.

Ekstrapiramidalne simptome moramo regulirati snižavanjem doze ili prekidom liječenja.

U bolesnika sa depresijom koštane moždine lijek smijemo primjenjivati samo ako je korist liječenja veća od rizika za bolesnika.

#### *Posebne informacije o nekim sastojcima lijeka*

Lijek Torecan sadrži sorbitol (E420) i natrij metabisulfit (E223). Treba uzeti u obzir aditivni učinak istovremeno primijenjenih proizvoda koji sadrže fruktozu (ili sorbitol) i unos fruktoze (ili sorbitola) hranom.

Intravenska primjena: Bolesnicima s nasljednom intolerancijom na fruktozu (HFI) ne smije se davati ovaj lijek osim ako to nije nužno. Detaljna historija s obzirom na simptome HFI mora uzeti svaki bolesnik prije davanja ovog lijeka.

Natrij metabisulfit može uzrokovati ozbiljne reakcije preosjetljivosti i bronhospazam.

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po dozi, što u biti znači "bez natrija".

#### 4.5. Interakcija sa drugim lijekovima i drugi oblici interakcije

Tietilperazin može povećati učinak depresora centralnog nervnog sistema, uključujući trankvilizatore, opioide, anestetike, hipnotike te alkohol. Triciklički antidepressivi mogu povećati učinak i toksičnost tietilperazina i obrnuto.

Budući da tietilperazin može uzrokovati adrenalnu suprotan učinak, adrenalin ne smijemo upotrebljavati za liječenje hipotenzije koja je posljedica uzimanja Torecana.

Uz istovremeno uzimanje tietilperazina i bromokriptina smanjuje se inhibitorni učinak bromokriptina kod supresije izlučivanja prolaktina, pa zato ne preporučujemo Torecan za bolesnike sa prolaktinomom, liječenih bromokriptinom.

Istovremeno uzimanje MAO inhibitora i fenotiazina može stepenovati nepovoljne učinke MAO inhibitora (hipotenzije, depresije centralnog nervnog sistema i disanja). Sličan učinak može imati istovremeno uzimanje fenotiazina i prokarbazina.

#### 4.6 Plodnost, trudnoća i dojenje

##### Trudnoća

Podaci o primjeni tietilperazina u trudnica su ograničeni. Ispitivanja na životinjama nisu dovoljna da bismo mogli isključiti teratogeni učinak tietilperazina (pogledajte poglavlje 5.3), jer su u dvama opservacijskim ispitivanjima ustanovili moguću povezanost. Iz razloga predostrožnosti lijek Torecan ne

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1.3.1                             | Thiethylperazine          |
| SPC, Labeling and Package Leaflet | BA-Bosnia and Herzegovina |

smijete upotrebljavati tijekom trudnoće.

#### Dojenje

Budući da se fenotiazini izlučuju u majčino mlijeko, lijek Torecan ne smijemo upotrebljavati tijekom dojenja (pogledajte poglavlje 4.3).

#### Plodnost

Liječenje tietilperazinom nije utjecalo na plodnost mužjaka štakora. Utjecaj na broj bređih ženki štakora opazili su samo kod doza većih od preporučenih, što ukazuje na malu važnost za kliničku primjenu.

### **4.7. Uticaj na sposobnost vožnje i upravljanja mašinama**

▲ Lijek sa snažnim uticajem na psihofizičke sposobnosti (zabrana upravljanja motornim vozilima i mašinama).

Lijek Torecan ima znatan utjecaj na sposobnost vožnje i upravljanje strojevima. Lijek može usporiti bolesnikove reakcije. Bolesnici koji dobivaju injekcije ne smiju voziti motorna vozila odnosno upravljati radnim strojevima.

### **4.8. Nuspojave**

Nuspojave koje se mogu pojaviti tokom liječenja Torecanom razvrstane su po učestalosti u sljedeće skupine:

- veoma česta ( $\geq 1/10$ ),
- česta ( $\geq 1/100$  do  $< 1/10$ ),
- povremena ( $\geq 1/1000$  do  $< 1/100$ ),
- rijetka ( $\geq 1/10.000$  do  $< 1/1000$ ),
- veoma rijetka ( $< 1/10.000$ ),
- nepoznata (nije moguće ocijeniti iz raspoloživih podataka).

U razvrstavanju učestalosti, nuspojave su navedene prema padajućoj ozbiljnosti.

Učestalost neželjenih djelovanja na pojedine organske sisteme:

#### *Srčane bolesti*

- veoma rijetka: tahikardija

#### *Bolesti nervnog sistema*

- povremena: glavobolja, omamljenost, pospanost, nemir
- rijetka: konvulzije ili ekstrapiramidni učinci. Potonji se mogu manifestovati kao tortikolis, opistotonus, okulogirne krize, rigidnost te grimase lica, a pojavljuju se osobito kod djece i adolescenata. Kod starijih ljudi se nakon dužeg uzimanja pojavljuje tardivna diskinezija (nehotični pokreti).

- veoma rijetka: trigeminalna neuralgija

#### *Očne bolesti*

- rijetka: nakon dugotrajna uzimanja mogu se pojaviti замуćenje leće ili zamagljeni vid

#### *Bolesti probavnog trakta*

- rijetka: anoreksija, suha usta

#### *Bolesti endokrinog sistema*

- rijetka: nakon dugotrajnog uzimanja može se pojaviti ginekomastija

#### *Bolesti krvotoka*

- rijetka: hipotenzija, periferni edemi udova i lica

#### *Bolesti jetre, žučnog mjehura i žučovoda*

- veoma rijetka: holestatska žutica

Iako neke nuspojave, karakteristične za fenotiazine, nisu opazili kod uzimanja tietilperazina, ljekar koji propisuje Torecan mora biti upoznat sa njima. To su krvne diskrazije (trombocitopenija, leukopenija, agranulocitoza, aplastična anemija i pancitopenija), paralitički ileus, mioza, eritem, ekfolijativni dermatitis, nepravilnosti T- vala u EKG-u i endokrini poremećaji (poremećaji menstrualnog ciklusa, promijenjen libido te porast tjelesne težine).

Ako dođe do teških neželjenih djelovanja, liječenje treba prekinuti.

#### Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstava lijekova, a nakon stavljanja lijeka u promet, je od velike važnosti za formiranje kompletnije slike o bezbjedonosnom profilu lijeka, odnosno za formiranje što

|                 |                                  |             |
|-----------------|----------------------------------|-------------|
| PI_Text074959_1 | 14.06.2024 - Updated: 14.06.2024 | Page 3 of 6 |
|-----------------|----------------------------------|-------------|

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1.3.1                             | Thiethylperazine          |
| SPC, Labeling and Package Leaflet | BA-Bosnia and Herzegovina |

bolje ocjene odnosa korist/rizik pri terapijskoj primjeni lijeka.

Proces prijave sumnji na neželjena dejstva lijeka doprinosi kontinuiranom praćenju odnosa koristi/rizik i adekvatnoj ocjeni bezbjedonosnog profila lijeka. Od zdravstvenih stručnjaka se traži da prijave svaku sumnju na neželjeno dejstvo lijeka direktno ALMBIH. Prijava se može dostaviti:

- putem softverske aplikacije za prijavu neželjenih dejstava lijekova za humanu upotrebu (IS Farmakovigilansa) o kojoj više informacija možete dobiti u nasoj Glavnoj kancelariji za farmakovigilansu, ili
- putem odgovarajućeg obrasca za prijavljivanje sumnji na neželjena dejstva lijeka, koji se mogu naći na internet adresi Agencije za lijekove: [www.almbih.gov.ba](http://www.almbih.gov.ba). Popunjen obrazac se može dostaviti ALMBIH putem pošte, na adresu Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, Veljka Mladenovica bb, Banja Luka, ili elektronske pošte (na e-mail adresu: [ndl@almbih.gov.ba](mailto:ndl@almbih.gov.ba)).

#### 4.9. Predoziranje

Znakovi i simptomi prevelikog doziranja su slični kao kod prevelikih doza drugih fenotiazina: suha usta, omaglica, smušenost, posturalna hipotenzija, kolaps; kod težih trovanja pojavljuju se koma, arefleksija, tahikardija te depresija disanja. Mogu se pojaviti i znakovi akutne distonije, konvulzije i agitiranost.

Nema specifičnog protusredstva. Kod bolesnika pratimo životne funkcije i liječimo ga simptomatski. Distonične reakcije liječimo antiparkinsonicima, konvulzije benzodiazepinima, a cirkulatorni kolaps nadomjestcima plazme i vazopresorima (adrenalin ne smijemo upotrijebiti, a smijemo upotrijebiti noradrenalin).

### 5. FARMAKOLOŠKE OSOBINE

#### 5.1 Farmakodinamičke osobine

Farmakoterapetska grupa: antihistaminici za sistemsku primjenu, derivati fenotiazina, ATC šifra: R06AD03.

##### Mehanizam djelovanja

Lijek spada u skupinu fenotiazina, koji su antagonisti dopaminergičkih receptora. Ti receptori su prisutni u strukturama centralnog nervnog sistema. Te strukture normaliziraju fiziološke procese povezane sa povraćanjem i vrtoglavicom.

Antiemetički učinak Torecana posljedica je djelovanja na centar za povraćanje u lateralnoj retikularnoj formaciji produžene moždine i na hemoreceptorsku indukcijsku zonu u području četvrte moždane komore. Blokadom tih struktura prekinuti su referentni signali koji potiču efektore - instrumente procesa povraćanja. Tietilperazin vjerojatno inhibira i aferentne impulse autonomnog nervnog sistema preko vagusa. Do antiemetičkog učinka dolazi 30 minuta nakon oralne aplikacije, a traje približno 4 sata.

Budući da Torecan spada u skupinu fenotiazina, ima i psihotropni učinak. Iako je on kod malih doza u usporedbi sa antiemetičkim vrlo mali, uzrok je za neka neželjena djelovanja Torecana. Također su ekstrapiramidna neželjena djelovanja neposredna posljedica zaviranja inhibicije dopaminergičkih receptora i razorene ravnoteže između dopaminergičkih i holinergičkih receptora.

#### 5.2 Farmakokinetičke osobine

##### *Raspodjela*

Tietilperazin je veoma lipofilan te se u visokom postotku veže na membrane ili bjelančevine u plazmi (preko 85%). Nakuplja se u organima A velikim krvnim protokom i lako prolazi kroz placentu. Volumen distribucije je 2,7 l/kg. Nemoguće ga je ukloniti dijalizom.

##### *Biotransformacija i izlučivanje*

Većinom se metabolizira u jetri, samo 3% ga se izluči kroz bubrege. Poluvrijeme eliminacije iznosi približno 12 sati.

Preciznija ispitivanja farmakokinetike tietilperazina pri ljudih kod ljudi za sada nisu provedena.

#### 5.3 Pretkliničke studije o bezbjednosti lijeka

U pretkliničkim ispitivanjima učinke su opazili samo kod izloženosti koja je snažno premašivala najveću izloženost kod čovjeka, što ukazuje na malu važnost za kliničku primjenu.

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1.3.1                             | Thiethylperazine          |
| SPC, Labeling and Package Leaflet | BA-Bosnia and Herzegovina |

#### Ispitivanja toksičnosti

##### Mutagenost

Kod testa mutagenosti na bakterijama *Salmonella typhimurium* i *Escherichia coli* tietilperazin nije pokazao mutageni potencijal.

##### Kancerogeni potencijal

Kancerogeni potencijal tietilperazina nisu ocjenjivali.

##### Reproduktivna toksičnost

Kod štakora i kunića nije bilo dokaza o teratogenom potencijalu ili toksičnom utjecaju na reproduktivni razvoj, iako su ta ispitivanja imala ograničenja. Uz velike doze koje su bile toksične za majku i koje su uvelike premašivale kliničku dozu, kod miševa (50 mg/kg/dan) i štakora (200 mg/kg/dan) izvještavali su o većoj učestalosti pojavljivanja zečje usne. Kliničko značenje tog saznanja za primjenu tietilperazina tijekom trudnoće kod ljudi nije poznat.

## **6. FARMACEUTSKE POJEDINOSTI**

### **6.1. Popis pomoćnih supstanci**

askorbinska kiselina

sorbitol (E420)

natrij metabisulfit (E223)

voda za injekcije

### **6.2 Inkompatibilnosti**

Zbog fizikalne nekompatibilnosti Torecan otopine za injekciju sa nekim drugim otopinama za injekciju, ne savjetujemo miješanje otopine lijeka sa drugima.

### **6.3 Rok upotrebe**

3 godine

### **6.4. Posebne mjere kod čuvanja lijeka**

Lijek čuvajte zaštićeno od svjetla na temperaturi do 25°C.

### **6.5. Priroda i sadržaj pakovanja**

Ampula (porozno staklo, tip I): 50 ampula po 1 ml otopine za injekciju, u kutiji.

### **6.6. Specijalna upozorenja za odlaganje neupotrijebljenih lijekova, ili otpadnih materija dobijenih iz ovih lijekova**

Neiskorišteni lijek ne treba odlagati u kućni otpad ili ga bacati u otpadne vode. Potrebno je pitati farmaceuta za najbolji način odlaganja neutrošenog lijeka, jer se na taj način čuva okolina.

### **6.7. Način i mjesto izdavanja**

Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa.

## **7. PROIZVOĐAČ**

KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto, Republika Slovenija

### **PROIZVOĐAČ GOTOVOG LIJEKA**

KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto, Republika Slovenija

### **NOSILAC DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA PROMET**

KRKA FARMA d.o.o.

Džemala Bijedića 125 A, Sarajevo, BiH

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1.3.1                             | Thiethylperazine          |
| SPC, Labeling and Package Leaflet | BA-Bosnia and Herzegovina |

**8. DATUM I BROJ RJEŠENJA O DOZVOLI ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET**  
TORECAN 6,5 mg/ml otopina za injekciju: 04-07.3-2-10142/24 od 22.05.2025.

**9. DATUM REVIZIJE SAŽETKA**  
22.05.2025.